



## **Actualités de la déclinaison régionale Nouvelle-Aquitaine du PNA en faveur du Phragmite aquatique – Juin 2026 –**



### **La vie du réseau...**

La conservation du Phragmite aquatique repose sur la mobilisation d'un réseau d'acteurs impliqués dans l'acquisition des connaissances, la gestion et la préservation de ses habitats.

Gestionnaires d'espaces naturels, associations, collectivités contribuent, chacun à leur échelle, à améliorer les connaissances sur cette espèce mondialement menacée et à mettre en œuvre des actions de conservation.

Cette nouvelle édition de la newsletter de la déclinaison régionale Nouvelle-Aquitaine du Plan national d'actions en faveur du Phragmite aquatique est destinée à mettre en lumière les différentes actions destinées à renforcer la connaissance et la conservation de l'espèce : animation et développement du réseau régional de prospection en migration postnuptiale, identification des camps de baguage avec mise en œuvre du protocole ACROLA, mise en place de suivis de la disponibilité alimentaire sur les sites de haltes avérés ou potentiels, et accompagnement des gestionnaires dans la mise en œuvre de suivis et d'actions de gestion des habitats.

Nous espérons que cette édition vous apportera des éléments utiles pour poursuivre ou développer des actions en faveur du Phragmite aquatique sur vos sites.



## **Recherche du Phragmite aquatique : participez au réseau régional de prospection**

Chaque année, la déclinaison régionale Nouvelle-Aquitaine du Plan national d'actions coordonne un réseau de prospection visant à améliorer la connaissance des haltes migratoires du Phragmite aquatique.

Les gestionnaires d'espaces naturels, associations et ornithologues disposant des compétences nécessaires à l'identification de l'espèce sont invités à mettre en œuvre le protocole régional de prospection sur leurs sites.

### **Effort de prospection**

- Période de prospection : du 10 au 20 août.
- Habitats ciblés : prés salés, prairies hygrophiles, roselières basses hétérogènes, scirpaies, magnocariçaies et autres habitats favorables régulièrement inondés.
- Effort d'échantillonnage : environ 1 point de prospection pour 10 hectares d'habitats favorables.
- Durée des prospections : 30 minutes par point, réalisées entre le lever du soleil et les quatre heures qui suivent, à raison d'une à deux matinées de prospection par point.
- Méthode : utilisation d'un leurre sonore standardisé et transmission des données, y compris des prospections sans contact, au coordinateur régional du PNA.

L'inscription auprès de l'animation régionale du PNA est un préalable à toute mise en œuvre du protocole. Elle permet de garantir l'utilisation d'une méthodologie harmonisée à l'échelle régionale et d'assurer la centralisation des données. Après inscription, les participants reçoivent le protocole complet, la bande sonore standardisée et le fichier de saisie des données.

Si vous souhaitez participer à l'effort de prospection visuelle en 2026, merci de bien vouloir inscrire votre site [ici](#).



## **Suivi de la disponibilité alimentaire : un nouvel axe de travail du PNA**

La qualité d'une halte migratoire repose sur la disponibilité des ressources alimentaires permettant aux oiseaux de reconstituer rapidement leurs réserves énergétiques avant de poursuivre leur migration.

Dans ce contexte, la déclinaison Nouvelle-Aquitaine du Plan national d'actions souhaite engager une réflexion sur la mise en place d'un indicateur de disponibilité alimentaire, basé sur l'échantillonnage des principales proies consommées par l'espèce.

Les premières analyses de 65 fientes collectées en France en 2024 dans le cadre du PNA montrent que le régime alimentaire du Phragmite aquatique en migration postnuptiale est dominé par les Diptères (72,3 %), les Hémiptères (61,5 %), les Araignées (46,2 %), les Collemboles (38,5 %), les Coléoptères (32,3 %), les Lépidoptères (32,3 %) et les Hyménoptères (30,8 %). Les Orthoptères (15,4 %) et les Psocodés (15,4 %) sont également régulièrement

consommés. Ces premiers résultats constituent une base solide pour orienter le choix des méthodes de piégeage les plus pertinentes afin d'évaluer la disponibilité de ces proies sur les sites de halte migratoire.

## Quel dispositif selon les habitats ?

La synthèse ci-dessous est issue des réflexions méthodologiques engagées conjointement dans le cadre du Plan national d'actions en faveur du Phragmite aquatique et du LIFE AWOM. Elle vise à proposer une première clé d'entrée opérationnelle, basée sur les grands types d'habitats fréquentés par l'espèce en halte migratoire. Cette synthèse constitue une première proposition méthodologique qui a vocation à évoluer au regard des retours d'expérience des gestionnaires et des travaux conduits dans le cadre du PNA et du LIFE AWOM.

| Habitat                                  | Dispositif recommandé         | Compléments possibles                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Roselières (Phragmites)</b>           | Malaise type Bartak ou Cornet | Piège à émergence à proximité de l'eau                        |
| <b>Cladiaies</b>                         | Malaise type Bartak ou Cornet | —                                                             |
| <b>Scirpaies hautes</b>                  | Malaise type Bartak ou Cornet | —                                                             |
| <b>Scirpaies basses</b>                  | Biocénomètre + aspiration     | Malaise selon le contexte                                     |
| <b>Jonchaies</b>                         | Biocénomètre + aspiration     | D-Vac possible                                                |
| <b>Prairies humides &amp; prés salés</b> | Biocénomètre + aspiration     | Filet fauchoir pour compléter l'échantillonnage des araignées |
| <b>Interface eau-végétation</b>          | Piège à émergence             | En complément d'un dispositif principal                       |

## Points de vigilance

- Les **pièges Malaise** et **Cornets** sont les plus adaptés aux végétations hautes et denses, mais nécessitent un tri entomologique conséquent.
- Le **biocénomètre associé à une aspiration** offre une excellente reproductibilité dans les milieux ouverts, sous réserve que le cadre puisse être correctement posé au sol.
- Le **piège à émergence** constitue un complément intéressant pour cibler les Chironomidae.
- Les **pièges Barber** apparaissent, à ce stade des connaissances, peu adaptés pour répondre seuls à la question de la disponibilité alimentaire du Phragmite aquatique.

## Proposition de suivi

Les gestionnaires disposant de compétences en détermination des arthropodes, ou travaillant en partenariat avec des spécialistes, peuvent, s'ils le souhaitent, mettre en œuvre ce type de suivi dès cette année sur leurs sites. Afin de faciliter l'animation du réseau, le partage des retours d'expérience et l'identification des

sites pilotes, les structures intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de l'animation régionale du PNA.

Ces premiers retours permettront d'évaluer la faisabilité des différentes méthodes, d'identifier leurs contraintes de mise en œuvre et d'alimenter la construction d'un protocole harmonisé à l'échelle nationale, en s'appuyant sur un réseau régional de sites pilotes. Ils contribueront également à améliorer notre connaissance de la qualité fonctionnelle des haltes migratoires utilisées par le Phragmite aquatique.

Les gestionnaires d'espaces naturels souhaitant s'investir plus largement dans cette démarche pourront également intégrer le groupe de travail « Ressources alimentaires » du Plan national d'actions, afin de participer aux échanges méthodologiques, au partage des retours d'expérience et à la co-construction du futur protocole national de suivi de la disponibilité alimentaire.

Si vous envisagez mettre en place un suivi sur la disponibilité alimentaire, merci de bien vouloir inscrire votre site [ici](#).



## Camps de baguage : inscrivez vous

Les camps de baguage constituent des opportunités privilégiées pour améliorer la connaissance du Phragmite aquatique en migration postnuptiale. Les structures organisant un camp de baguage entre juillet et septembre avec mise en place du protocole ACROLA sont invitées à se faire connaître auprès de l'animation régionale.

La coordination des initiatives à l'échelle régionale permettra de renforcer la couverture géographique des prospections, de favoriser les échanges d'expérience entre équipes et de mieux valoriser les données acquises dans le cadre du Plan national d'actions.

Si vous organisez un camp de baguage, merci de bien vouloir inscrire votre site [ici](#).



# Un accompagnement à votre disposition

L'animation régionale de la déclinaison Nouvelle-Aquitaine du Plan national d'actions est à la disposition des gestionnaires d'espaces naturels pour les accompagner dans la prise en compte du Phragmite aquatique sur leurs sites, favoriser les échanges entre acteurs et diffuser les connaissances acquises dans le cadre du PNA.

N'hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur :

- la mise en œuvre des protocoles de prospection ou de suivi ;
- l'identification des habitats favorables à l'espèce ;
- la définition ou l'évaluation de travaux de gestion et de restauration des habitats ;
- l'intégration des enjeux liés au Phragmite aquatique dans vos plans de gestion ou vos projets de conservation.

Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, merci de bien vouloir renseigner le formulaire [ici](#).



## Contact

Pour toute question relative à la déclinaison régionale Nouvelle-Aquitaine du Plan national d'actions en faveur du Phragmite aquatique, à la mise en œuvre des protocoles, aux actions de gestion ou aux possibilités d'accompagnement, vous pouvez contacter :

**Dr Raphaël MUSSEAU**

Coordinateur de la déclinaison régionale Nouvelle-Aquitaine

Plan national d'actions en faveur du Phragmite aquatique

BioSphère Environnement

E-mail : [musseau.biosphere-environnement@orange.fr](mailto:musseau.biosphere-environnement@orange.fr)

